



Vorbereitung zur Coloskopie mit „Moviprep“

Ihr Termin: _____ Uhrzeit: _____

Fünf Tage vor der Untersuchung:

- **Kein kernhaltiges** Obst wie Kiwi und Weintrauben, **keinen** Salat, **keine** Vollkornprodukte, **kein Müsli**, **kein Gemüse** wie Gurken, Tomaten, Paprika, Spinat, Erbsen, Bohnen, Mais, Linsen, Pilze, Spargel
- **Essen Sie bitte z.B.:** Mehlspeisen, Weißbrot, Kartoffeln, Nudeln, Fisch, Fleisch, geschälten Reis, Omlet, Rührei, fettarme Milchprodukte, magere Wurstsorten oder milden Käse, Obstkompott
- Viel Trinken (mindestens 2 Liter!) und bewegen (z.B. Spaziergehen, Radfahren)!

Am Tag vor der Untersuchung:

- Zum Frühstück z. B.: Weißbrot, Honig, Marmelade, Tee und Kaffee (ohne Milch)
- Mittags: klare Gemüsebrühe
- Danach dürfen Sie bitte nichts mehr essen, aber **soviel wie möglich kohlenstofffreie** und nur **klare Flüssigkeit** (Säfte, Tee oder Wasser) trinken bis **2 Stunden vor der Untersuchung!**

Termin 7 - 8 Uhr:	Am Tag <u>vor</u> der Untersuchung um 18 Uhr + 21 Uhr je 1 Beutel A+B Moviprep in 1 Liter Leitungswasser auflösen und verteilt über eine Stunde trinken + soviel wie möglich kohlenstofffreie Getränke.
---------------------------------------	---

Termin 8 - 9 Uhr:	Am Tag <u>vor</u> der Untersuchung um 19 Uhr + 21 Uhr je 1 Beutel A+B Moviprep in 1 Liter Leitungswasser auflösen und verteilt über eine Stunde trinken + soviel wie möglich kohlenstofffreie Getränke.
---------------------------------------	---

Termin 9 - 10 Uhr:	Am Tag <u>vor</u> der Untersuchung um 19 Uhr und <u>am Tag</u> der Untersuchung um 5 Uhr je 1 Beutel A+B Moviprep in 1 Liter Leitungswasser auflösen und verteilt über eine Stunde trinken + soviel wie möglich kohlenstofffreie Getränke.
--	--

Termin 10 - 11 Uhr:	Am Tag <u>vor</u> der Untersuchung um 19:30 Uhr und <u>am Tag</u> der Untersuchung um 6 Uhr je 1 Beutel A+B Moviprep in 1 Liter Leitungswasser auflösen und verteilt über eine Stunde trinken + soviel wie möglich kohlenstofffreie Getränke.
---	---

Termin 11 - 12 Uhr:	Am Tag <u>vor</u> der Untersuchung um 20 Uhr und <u>am Tag</u> der Untersuchung um 7 Uhr je 1 Beutel A+B Moviprep in 1 Liter Leitungswasser auflösen und verteilt über eine Stunde trinken + soviel wie möglich kohlenstofffreie Getränke.
---	--

Achtung, 2. Seite, bitte wenden!!!!!!!!!!!!!!



Bitte bringen Sie ein großes Badehandtuch mit!

Medikamente können wie gewohnt eingenommen werden, aber:

Achtung Blutverdünnung bzw. Diabetesmedikamente:

Metformin bitte 2 Tage vorher absetzen

(Patienten mit Diabetes mellitus und Insulintherapie bitte Rücksprache mit dem behandelndem Diabetologen)

Marcumar muss abgesetzt werden (aktueller Quickwert über 65 % = INR 1,3)

Aggrenox 7 Tage vorher absetzen!

Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa 48 Stunden vorher absetzen!

Clopidogrel, Plavix, Iscover, Brilique, ASS können weiter eingenommen werden!!!!!!

Ausnahme: Kombination mit ASS!!! Dann in den letzten sieben Tagen vor der Untersuchung nur ASS alleine weiternehmen!

Wichtig!! Blutverdünnungsmedikamente nur nach Rücksprache mit dem Hausarzt bzw. Kardiologen absetzen!!!

Der Aufenthalt in unserer Praxis beträgt ca. 2 bis 3 Stunden!

Sie dürfen nach der Spiegelung 12 Stunden nicht selbst Auto- oder Radfahren!